

Применение препарата Реаферон-ЕС Липинт при лечении больных язвенным колитом.

Крылова Н.А.

МЛПУ МСЧ №2 г. Томска.

Врач высшей категории, гастроэнтеролог.

Неспецифический язвенный колит (НЯК) - многофакторное заболевание, при котором развивается иммунное воспаление слизистой толстого кишечника, приводящее к ее деструктивным изменениям и дисфункции, эндотоксемии, системным и метаболическим нарушениям. Основными препаратами лечения НЯК являются производные 5-аминосалициловой кислоты (месалазин, салазин и т.д.), кортикостероиды, цитостатики, иммунодепрессанты, однако до настоящего времени эффективное лечение НЯК остается одной из актуальных задач гастроэнтерологии, т.к. традиционное лечение не устраняет иммунных патологических нарушений. В сообщениях последних лет имеется положительный опыт применения рекомбинантного интерферона- α в лечении НЯК. Учитывая, что Реаферон-ЕС-Липинт, представляет собой интерферон- α человеческий рекомбинантный, заключенный в липосомы, защищающие интерферон от разрушения и обеспечивающие его длительную циркуляцию в крови, можно предположить, что препарат Реаферон-ЕС-Липинт будет эффективен при данной патологии.

Мы использовали Реаферон-ЕС-Липинт у больной И.А.М. 1974 г. р. при тяжелом течении НЯК на фоне туберкулеза легких по схеме: 500 тыс. МЕ 2 раза в сутки в течение 20 дней за 30 минут до еды, в комплексе с месалазином 0,8 х 3 раза в сутки после еды. Кроме этого было назначено: свечи месалазина 0,5 г на ночь ректально и 30 мг преднизолона в сутки.

Применение Реаферон-ЕС-Липинта эффективно купировало клинические проявления заболевания: примесь крови в кале исчезла на 5-6 сутки болезни (у других больных, получавших базисную терапию, это удается на 15-17 сутки), нормализация стула и купирование болевого синдрома наступили на 3-4 день, тогда как, у больных на базисной терапии, это происходит на 9-10 день. Эндоскопическая ремиссия НЯК (контроль КФС): эпителизация язв, исчезновение отечности, гиперемии, контактной кровоточивости слизистой у больной на фоне приема Реаферон-ЕС-Липинта определялось на 28 день лечения. Тогда как, при применении базисной терапии, эндоскопическая ремиссия наступает, в среднем, через 1,5 месяца. Характерно что, на фоне лечения Реаферон-ЕС-Липинтом, увеличилась доля субпопуляции цитотоксических Т-лимфоцитов и нормализовался иммуннорегуляторный индекс, указывающие на снижение аутоиммунной агрессии. Клинико-эндоскопическая ремиссия заболевания после отмены преднизолона сохранялась в течение двух лет.

[Более подробно о применении препарата Реаферон-ЕС Липинт для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ у детей читайте на официальном сайте препарата.](#)