

Опыт применения препарата Реаферон-ЕС-Липинт в практике врача педиатра.

Зав. педиатрического отделения №1 детской поликлиники №6 г. Краснодар Серёда Галина Константиновна

Девочке Лерочке 5 лет, она ходит в свой любимый детский сад. Но одно плохо, ребёнок часто болеет простудными заболеваниями, которые почти всегда осложняются острыми бронхитами. Заболевания длятся две, а то и три недели.

Дважды за свою жизнь девочка перенесла острую бронхопневмонию, была обследована на оппортунистические инфекции, результаты отрицательные: в иммунограмме у девочки отмечалось снижение уровня СД 3, СД 4, также выявлено снижение YG-M до 1.0, YG-g до 9,6.

Когда Лерочка заболела в очередной раз, то вместе с проведением симптоматической терапии, был назначен Реаферон-ЕС-Липинт по следующей схеме: 250 тыс. МЕ 2 раза в день за 30 мин до еды в течение 3-х дней. Температура у девочки нормализовалась на 2-е сутки, катаральные явления значительно уменьшились к пятому дню. После проведенного лечения повысился уровень YG- M до 1,8 YG-g до 14,2; заболевание протекало без осложнения, длительность его уменьшилась до 7 дней вместо 3-х недель, побочных реакций на препарат не отмечалось. Через 7 дней Лерочка вновь пошла в детский сад.

В целях профилактики Реаферон-ЕС-Липинт был назначен ребёнку еще на 4 недели по 250 тыс. МЕ один раз в день за 30 минут до еды 2 раза в неделю.

Следовательно, препарат Реаферон ЕС-Липинт может быть использован в комплексном лечении и оздоровлении часто болеющих детей.

[Более подробно о применении препарата Реаферон-ЕС Липинт для профилактики и лечения гриппа и ОРВИ у детей читайте на официальном сайте препарата.](#)